

SARS 制圧までの迅速性(国別比較)(2002 年 11 月 1 日～2003 年 7 月 31 日)

地域	男	女	計	年齢の中央値 (範囲)	死亡者数 ^a	致死率 (%)	輸入例 (%)	医療従事者の 感染者数(%)	最初の「可能性例」 発症日① (日/月/年)	最終の「可能性例」発 症日② (日/月/年)	期間 (②-①)
オーストラリア	4	2	6	15 (1~45)	0	0%	6 (100%)	0 (0%)	2003 年 2 月 26 日	2003 年 4 月 1 日	35
カナダ	151	100	251	49 (1~98)	43	17%	5 (2%)	109 (43%)	2003 年 2 月 23 日	2003 年 6 月 12 日	110
中国	2,674	2,607	5,327 ^b	保留	349	7%	n.a.	1,002 (19%)	2002 年 11 月 16 日	2003 年 6 月 3 日	200
香港	977	778	1,755	40 (0~100)	299	17%	n.a.	386 (22%)	2003 年 2 月 15 日	2003 年 5 月 31 日	106
マカオ	0	1	1	28	0	0%	1 (100%)	0 (0%)	2003 年 5 月 5 日	2003 年 5 月 5 日	1
台湾	218	128	349	42 (0~93)	37	11%	21 (6%)	68 (20%)	2003 年 2 月 25 日	2003 年 6 月 15 日	111
フランス	1	6	7	49 (26~61)	1	14%	7 (100%)	2 (29%) ^c	2003 年 3 月 21 日	2003 年 5 月 3 日	44
ドイツ	4	5	9	44 (4~73)	0	0%	9 (100%)	1 (11%)	2003 年 3 月 9 日	2003 年 5 月 6 日	59
インド	0	3	3	25 (25~30)	0	0%	3 (100%)	0 (0%)	2003 年 4 月 25 日	2003 年 5 月 6 日	12
インドネシア	0	2	2	56 (47~65)	0	0%	2 (100%)	0 (0%)	2003 年 4 月 6 日	2003 年 4 月 17 日	12
イタリア	1	3	4	30.5 (25~54)	0	0%	4 (100%)	0 (0%)	2003 年 3 月 12 日	2003 年 4 月 20 日	40
クウェート	1	0	1	50	0	0%	1 (100%)	0 (0%)	2003 年 4 月 9 日	2003 年 4 月 9 日	1
マレーシア	1	4	5	30 (26~84)	2	40%	5 (100%)	0 (0%)	2003 年 3 月 14 日	2003 年 4 月 22 日	40
モンゴル	8	1	9	32 (17~63)	0	0%	8 (89%)	0 (0%)	2003 年 3 月 31 日	2003 年 5 月 6 日	37
ニュージーランド	1	0	1	67	0	0%	1 (100%)	0 (0%)	2003 年 4 月 20 日	2003 年 4 月 20 日	1
フィリピン	8	6	14	41(29~73)	2	14%	7 (50%)	4 (29%)	2003 年 2 月 25 日	2003 年 5 月 5 日	70
アイルランド	0	1	1	56	0	0%	1 (100%)	0 (0%)	2003 年 2 月 27 日	2003 年 2 月 27 日	1
韓国	0	3	3	40 (20~80)	0	0%	3 (100%)	0 (0%)	2003 年 4 月 25 日	2003 年 5 月 10 日	16
ルーマニア	0	1	1	52	0	0%	1 (100%)	0 (0%)	2003 年 3 月 19 日	2003 年 3 月 19 日	1
ロシア	0	1	1	25	0	0%	n.a.	0 (0%)	2003 年 5 月 5 日	2003 年 5 月 5 日	1
シンガポール	161	77	238	35 (1~90)	33	14%	8 (3%)	97 (41%)	2003 年 2 月 25 日	2003 年 5 月 5 日	70
南アフリカ	0	1	1	62	1	100%	1 (100%)	0 (0%)	2003 年 4 月 3 日	2003 年 4 月 3 日	1
スペイン	0	1	1	33	0	0%	1 (100%)	0 (0%)	2003 年 3 月 26 日	2003 年 3 月 26 日	1
スウェーデン	3	2	5	43 (33~55)	0	0%	5 (100%)	0 (0%)	2003 年 3 月 28 日	2003 年 4 月 3 日	7
スイス	0	1	1	35	0	0%	1 (100%)	0 (0%)	2003 年 3 月 9 日	2003 年 3 月 9 日	1
タイ	5	4	9	42 (2~79)	2	22%	9 (100%)	1 (11%) ^c	2003 年 3 月 11 日	2003 年 5 月 27 日	78
イギリス	2	2	4	59 (28~74)	0	0%	4 (100%)	0 (0%)	2003 年 3 月 1 日	2003 年 4 月 1 日	32
アメリカ	14	15	29	33 (0~83)	0	0%	28 (97%) ^d	0 (0%)	2003 年 2 月 24 日	2003 年 7 月 13 日 ^e	140
ベトナム	39	24	63	43 (20~76)	5	8%	1 (2%)	36 (57%)	2003 年 2 月 23 日	2003 年 4 月 8 日	45
合計	-	-	8,098	-	774	9.6%	143	1,707 (21%)			

(出所) 国立感染症研究所感情報センター

(注) a) 死亡者数は SARS が死亡原因の症例だけを含む。

b) 中国では 46 症例が性別不明のため、男女両方の症例数にカウントされている。

c) 他の地域で罹患した医療従事者も含む。

d) 1 症例の感染経路は不明。

e) アメリカは当初、WHO の症例定義と異なる定義を用いていたが、2003 年 7 月 5 日以降に発生した症例については、SARS 可能性例だけを報告している。